

Link do produktu: <https://www.sklep.freshfarmlogistics.pl/duracid-pw-1kg-p-1281.html>

DURACID PW 1kg



Cena **39,00 zł**

Numer katalogowy **DUR-PW-1**

Opis produktu

Duracid PW to gotowy do użycia produkt w postaci proszku do rozsypywania, przeznaczony do zwalczania owadów biegających, pluskiew, pcheł i ptaszyńca kurzego.

Substancja czynna:

Cypermetryna 0,632 g/ 100g

Produkt zawiera dwutlenek krzemu i gorzką substancję zapobiegającą spożyciu przez ludzi i zwierzęta niedocelowe.

Stosowanie:

Przed zastosowaniem produktu należy zidentyfikować miejsca, w których owady bytują lub gdzie się przemieszczają – zwiększy to skuteczność ich zwalczania. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca ciemne i ciepłe w piwnicach i magazynach, a także obszary wokół rur wodociągowych, grzejników i kratki wentylacyjnych, pod szafkami i innymi meblami. Nie mieszać z innymi chemikaliami lub produktami.

ZWALCZANIE OWADÓW: karaczan prusak (*Blattella germanica*), karaczan wschodni (*Blatta orientalis*), mrówka (*Lasius niger*).

Zabieg przeprowadzać w miejscach wokół rur wodociągowych, grzewczych i wentylacyjnych, pod szafami i innymi dużymi obiektami. W przypadku mrówek i karaczana wschodniego produkt nie wykazuje efektu rezydualnego bójczonego – śmiertelność następuje po ok. 7 dniach od kontaktu owadów z powierzchniami, na które zaaplikowano produkt. Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji usunąć produkt oraz martwe owady.

SPOSÓB STOSOWANIA:

- Wewnątrz pomieszczeń: zastosować 5 g/m² produktu w postaci cienkich warstw w pęknięciach i szczelinach w pustych przestrzeniach i zagłębieniach, gdzie zwykle ukrywają się owady.

5 gramów produktu to około 4 łyżeczki.

- Na zewnątrz pomieszczeń rozsypać (5g/m²) cienką warstwę produktu w szpary i szczeliny tylko na powierzchniach utwardzonych, na balkony i tarasy.

Nie używać częściej niż 2 razy na rok.

Produkt wykazuje skuteczność przeciwko karaczanom do 8 tygodni oraz przeciwko mrówkom do 4 tygodni od zastosowania.

- Zwalczanie mrówek (*Lasius niger*) wokół budynków. Preparat stosować jako barierę, aby zapobiec przedostawaniu się mrówek do wnętrza budynku. Rozsypać produkt w ilości 5 g/m², na całym obwodzie budynku, pasem nie szerszym niż 1 cm. Produkt nie wywiera natychmiastowego efektu bójczego, natomiast śmiertelność spodziewana jest po 7 dniach od kontaktu owadów z powierzchniami poddanymi zabiegowi. Produkt nie wykazuje efektu rezydualnego przy zastosowaniu jako bariera wobec mrówek.

- Zwalczanie pcheł (*Ctenocephalides felis*) i pluskiew (*Cimex lectularius*) wewnątrz pomieszczeń.

Pluskwy osiedlają się w trudno dostępnych miejscach w pęknięciach ścian, złączach i szwach mebli, za obrazami itp. Owady te z reguły ograniczają się do tych miejsc i opuszczają je tylko po to, by żerować w nocy. Pluskwy zazwyczaj nie przebywają poza gniazdem w ciągu dnia lub przy włączonym świetle. Pchły zamieszkują pęknięcia w podłodze lub szczeliny w meblach.

Zastosować produkt w ilości 10 g/m² w postaci cienkich warstw w pęknięciach i szczelinach, tylko w miejscach o ograniczonej możliwości dostępu, na powierzchniach, gdzie czyszczenie na mokro nie jest możliwe, w pustych przestrzeniach i zagłębieniach, gdzie zwykle ukrywają się owady. 10 gramów produktu to około 8 łyżeczek. Produkt wykazuje skuteczność przeciwko pchłom i pluskwom do 2 tygodni od zastosowania. Nie używać częściej niż 2 razy na rok.

- Zwalczanie ptaszyńca kurzego (*Dermanyssus gallinae*).

Rozsypać ciekłą warstwę produktu w szpary i szczeliny. Produkt do zwalczania ptaszyńca kurzego w następujących systemach chowu i hodowli drobiu:

- Kury nioski, baterie klatkowe bez suszenia pomiotu powietrzem;
- Kury nioski, baterie klatkowe z suszeniem pomiotu powietrzem;
- Kury nioski, kompaktowe baterie klatkowe;
- Kury nioski, wolny wybieg z podłogą kratową;
- Brojlery rodzicielskie; >18 tygodnia, wolny wybieg z podłogą kratową;
- Brojlery rodzicielskie w odchowie, wolny wybieg z podłogą kratową. Przed zabiegiem należy oczyścić obiekt.

Preparat w ilości 10 g/m² nanosić w szczeliny i szpary, w których mogą ukrywać się roztocza. Skuteczność spodziewana jest po 1 tygodniu od zastosowania.

Produkt wykazuje skuteczność do 2 tygodni. Nie używać częściej niż 4 razy na rok z 91 dniową przerwą pomiędzy aplikacjami. Produktu nie stosować w budynkach inwentarskich połączonych z oczyszczalnią ścieków lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych. Podczas dozowania produktu do narzędzi aplikacyjnych, należy przykryć podłogę, aby uniknąć zanieczyszczenia podłoża.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.